

TRUSA DE URGENȚĂ PENTRU CABINETUL DE MEDICINĂ DENTARĂ

Autori:

Prof.univ.dr.Alexandru Bucur*

Conf.univ.dr.Octavian Dincă*

Ș.l.dr. Cristian Vlădan*

*Clinica de chirurgie OMF, Spitalul Clinic de chirurgie OMF "Prof.dr.D.Theodorescu" București

A. Aparatură și materiale obligatorii

1.	Tensiometru electronic cu măsurare la încheietura mâinii	1 buc.
2.	Feșe 10x10 cm	3 role
3.	Bandă adezivă 5x5 cm	2 role
4.	Soluție polividon-iodat (BETADINE, IODINA, IODOSEPT, POLIODINE) sau clorhexidină (HIBISCRUB, HIBITANE, CLORHEXIN, DESMANOL) pentru tegumente	1 flacon
5.	Seringi 5 ml / 10 ml sterile	5 buc.

B. Medicamente obligatorii

Nr.	DCI (denumirile comerciale sunt listate în paranteză)	Forma farmaceutică	Cantitate	Observații
1.	Nitroglicerină (NITROGLICERINA)	Cpr. 0,5 mg	1 cutie (20 cpr.)	Se administrează 1 cpr sublingual în criza de angină pectorală, infarct miocardic acut, edem pulmonar acut cu TA _s >100 mg Hg; se poate repeta administrarea la intervale de 5 min (până la 3-4 cpr)
	sau	sau	Atenție la valabilitate (6 luni) !	
	Nitroglicerină (MAYCOR NITRO SPRAY, NITROMINT)	Aerosol 0,4mg/doză	1 flacon (10 g)	Se administrează 2 pufuri sublingual în criza de angină pectorală, infarct miocardic acut, edem pulmonar acut cu TA _s >100 mg Hg; se poate repeta la 5 min.
2.	Nifedipină (ADALAT,CORDIPIN, CORINFAR,NIFEDIPIN, NIFADIL, NIFELAT)	Cpr. 10 mg	1 cutie (10 cpr.)	Se administrează 1 cpr. sublingual, pentru reducerea TA
3.	Acid acetilsalicilic (ASPIRINĂ)	Cpr. 500 mg	10 buc.	Se administrează ½ cp mestecat în cazul suspiciunii de infarct miocardic acut
4.	Enalapril (ENAP)	Cpr. 25 mg	10 buc	Se administrează 1 cpr sublingual pentru reducerea TA; la nevoie se mai poate administra 1 cpr

5.	Adrenalină1:1000	fiole 1mg/1ml	5 buc.	Se administrează în cazul șocului anafilactic 0,3 ml soluție injectabilă nediluată s.c. / intralingual; se poate repeta la 10-15 minute dacă este necesar (până la TA _s > 90 mm Hg)
	sau	sau		
	Adreanalina1:1000 (EPIPEN, EPIPEN 300)	stick autoinjector 0,3mg (adulți)	2 buc.	Se administrează în cazul șocului anafilactic, injectându-se o doză i.m.; se poate repeta la 10-15 minute dacă este necesar
	Adrenalină1:2000 (EPIPEN JUNIOR, EPIPEN 150) *	stick autoinjector 0,15 mg (copii>30 kg)	2 buc.	Se administrează în cazul șocului anafilactic, injectându-se o doză i.m.; se poate repeta la 10-15 minute dacă este necesar
* medicament obligatoriu doar în trusa de urgență din dotarea cabinetelor școlare de medicină dentară, conform <i>Ordinului comun al MEN/MS nr.3764/694/2018</i>				
6.	Hidrocortizon Hemisuccinat (FLEBOCORTID, HIDROCORTIZONE, HIDROCORTIZONE NATRIU SUCCINAT)	flacon 100mg sau fiole 25mg	10×100mg 40×25mg	Se administrează i.m. în cazul reacțiilor alergice acute, al crizei de astm bronșic sau al crizei Addisoniene
7.	Prometazină (ROMERGAN)	fiole 50mg/2ml	5 buc.	Se administrează i.m. profund o fiolă în cazul reacțiilor alergice acute
	sau			
	Loratadină (CLARITINE)	cpr.10 mg	5 buc.	Se administrează 1 cpr. în cazul reacțiilor alergice acute
	sau			
	Desloratadină (AERIUS)	cpr.5 mg	5 buc.	Se administrează 1 cpr. în cazul reacțiilor alergice acute
	sau			
	Cetirizină (ZYRTEC)	soluție 10mg/ml	1 sticlă	Se administrează 5 mg (10 picături) în cazul reacțiilor alergice acute
8.	Salbutamol (BUVENTOL, SALBUVENT, VENTOLIN)	spray 100 mcg/doză	1 buc.	Se administrează 1-2 pufuri inhalate oral în caz de criză de astm bronșic
9.	Glucoză 5%	flacon 1000 ml	1 buc.	Se administrează 5-10 ml oral în caz de hipoglicemie
10.	Diazepam	fiole 10 mg/2ml	5 buc.	Se administrează 1 fiolă i.m. în caz de criza convulsivă

11.	Ketorolac (KETOROL, KETRODOL, TORADOL)	Cpr 10mg	5 buc.	Se administrează 1 cpr. oral ca analgetic
	sau Metamizol (ALGOCALMIN, ANALGIN)	Cpr 500 mg	5 buc.	
12.	Drotavertină (NO-SPA)	Cpr. 40 mg	10 buc	Se administrează 1 cpr. oral ca analgetic la pacienta însărcinată
13.	Amoxicilină (OSPAMOX, DUOMOX, E-MOX, EPHAMOX, MOXILEN) **	Cpr. 500mg	5 buc.	Se administrează 2 g oral pentru antibioprofilaxie
	sau Clindamicină (DALACIN C, CLINDAMICIN, KLINDAN, LANACINE)	Cpr.600 mg	5 buc.	Se administrează 1 cpr oral pentru antiprofilaxie
** NU se administrează pacienților alergici la peniciline!!				

C. Aparatură facultativă:

- butelie de oxigen cu reductor
- balon de resuscitare
- pipă orafaringiană